

Fe ПИТАТЕЛЬНЫЙ РАСТВОР ФЕРОВИТ

г/л: хелат железа 75, азот 40,
сера 46, глицин 30

ФЕРОВИТ – повышает активность фотосинтеза и дыхания растений при низких температурах, недостатке света, дефиците доступного железа, засолении почвы.
После обработки продукцию можно употреблять в пищу на следующий день.

ПРИМЕНЯЕТСЯ

В любых почвенно-климатических условиях на всех культурах в течение всего периода вегетации. Препарат используется для замачивания семян, полива под корень при посадке и опрыскивании растений.
Опрыскивание проводят рано утром или вечером в сухую безветренную погоду, равномерно смачивая поверхность растений. Если осадки выпали спустя 4 часа, повторную обработку проводить не следует.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧЕГО РАСТВОРА

Феровит растворяют в небольшом количестве воды и тщательно перемешивают. При приготовлении баковых смесей препараты вносят в следующей последовательности: пестициды, удобрения и регулятор роста. Рабочий раствор используют в течение суток.

2-3 мл / 1 л воды; 20-30 мл / 10 л воды



1,5 мл ~ 60 капель
1 капля ~ 0,025 мл



УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Не хранить на прямых солнечных лучах и не замораживать.
Температура хранения от +4 до +30 °C.
Срок годности 4 года.
На срок хранения не влияет вскрыта была тара или нет.

СТИМУЛЯТОР ФОТОСИНТЕЗА

- Устраняет хлороз вызванный различными причинами.
- Компенсирует недостаток освещенности растений, особенно в осенне-зимний период для комнатных и оранжерейных растений.
- Предотвращает вытягивание рассады.
- Способствует лучшему завязыванию и вызреванию плодов.
- Ускоряет рост и развитие растений, предотвращает опадение цветков.

**ПРИМЕНЯЙТЕ ПРЕПАРАТЫ
ПО НОРМАМ, УКАЗАННЫМ В СХЕМАХ
ПРИМЕНЕНИЯ, СОГЛАСНО РЕГЛАМЕНТУ
ПРИМЕНЕНИЯ!**



**СОВМЕСТИМ
С УДОБРЕНИЯМИ,
СРЕДСТВАМИ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ,
БИОПРЕПАРАТАМИ
И РЕГУЛЯТОРАМИ РОСТА РАСТЕНИЙ**

ПРИМЕНЯТЬ СОГЛАСНО ИНСТРУКЦИИ:

Нормы применения Феровита для некорневой подкормки зависят от биомассы и фазы развития растений, их потребности в железе, содержании доступного железа в почве.

Культура, время, особенности применения	Доза применения
Овощные, цветочно-декоративные культуры - некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 4-6 раз с интервалом 15-20 дней	1,5-2,0 мл/л воды Расход рабочего раствора - 1-1,5 л/10 м ²
Плодово-ягодные культуры (деревья) - некорневая подкормка растений в период активного роста вегетативной массы растений 1-3 раза с интервалом 15-20 дней	1,5-3,0 мл/л воды Расход рабочего раствора - 2-10 л/дереву
Ягодные культуры (кустарники) - некорневая подкормка растений в период активного роста вегетативной массы растений 1-3 раза с интервалом 15-20 дней	1,5-4,0 мл/л воды Расход рабочего раствора - 1-1,5 л/10 м ² или 1,5-2 л/куст
Земляника - некорневая подкормка растений после посадки 1-3 раза с интервалом 7-10 дней	1,5-3,0 мл/л воды Расход рабочего раствора - 1-1,5 л/10 м ²
Земляника - некорневая подкормка растений весной в начале возобновления вегетации в фазе бутонизации и после сбора урожая	1,5-3,0 мл/л воды Расход рабочего раствора - 1-1,5 л/10 м ²
Овощные, цветочно-декоративные культуры (рассада) - некорневая подкормка растений 1 раз в неделю	1,5-3,0 мл/л воды Расход рабочего раствора - до смачивания листовой поверхности растения
Цветочно-декоративные культуры (горшечные) - некорневая подкормка растений в период активного роста 1 раз в неделю	1,5-3,0 мл/л воды Расход рабочего раствора - до смачивания листовой поверхности растения
Лекарственные культуры - подкормка растений в течение вегетационного периода 2-4 раза	1,0-1,5 мл/л воды Расход рабочего раствора - 1-1,5 л/10 м ²

Рекомендуем совмещать с регуляторами роста: Эпин-Экстра, Циркон, Домоцвет